

FICHA TÉCNICA · RODILON® SOFT BAIT**Marca Comercial:** Rodilon® Soft Bait**Nome Técnico:** Difetialona**Grupo Químico:** Benzotiopiranonas**Registrado no Ministério da Saúde sob n.º:** 3.3222.0047**N.º C.A.S.:** 104653-34-1**Formulação:** Isca**Concentração:** I.A: Difetialona 0,0025% p/p; Inertes: Atrativos, antioxidante, agente amargante, aglutinante e corante 99,9975 % p/p.**Denominação Química:** 3-[(1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphyl]-1-benzothi-in-2-one.**Fórmula Bruta:** C₃₁H₂₃BrO₂S**Dados Toxicológicos:** Toxicidade aguda - DL50 oral (ratos): > 2000 mg/kg p.c; DL50 dérmica (ratos): > 2000 mg/kg p.c.**Classe:** Raticida**Embalagem/Apresentação:** Saco de 200 g (20 sachês de 10 g). Caixa de Embarque de 10 kg (50 x 200g).**INDICAÇÃO DE USO**

Rodilon® Soft Bait é um raticida anticoagulante de dose única em forma de isca fresca extremamente palatável e atrativo devido a sua qualidade alimentar, textura e umidade. Possui grande aceitação para consumo dos roedores levando a uma rápida diminuição da infestação

Seus sachês de 10 g tem a medida certa trazendo benefícios adicionais com menor resíduo no ambiente e baixa exposição do operador (ausência de contato direto com a isca).

É indicado para controle de camundongos, ratos e ratazanas em ambientes com alta oferta de alimentos e em locais com alta infestação.

MODO DE APLICAÇÃO

Coloque os pontos de iscagem conforme tabela de aplicação em locais secos e em toda a área infestada (por exemplo: em ninhos, áreas de passagem de roedores, nos cantos onde forem encontradas evidências de fezes, pelos e gordura dos roedores).

A quantidade de iscas e o número de pontos de aplicação variam com o grau de infestação, espécie e o tamanho da área a ser desratizada. A quantidade de iscas deve ser suficiente para que todos os roedores tenham a oportunidade de consumo ao menos uma vez.

TABELA DE APLICAÇÃO:

Rodilon® Soft Bait vem pronto para uso. Basta colocar os sachês (iscas) sem abri-los no local de iscagem. Pode ser utilizado em caixas porta isca ou presos com arame.

	Ratos e Ratazanas		Camundongos	
Grau de Infestação	Alta	Baixa	Alta	Baixa
Distância entre os pontos de Iscagem	4 – 5 m	8 – 10 m	1 – 2 m	2 – 3 m
Quantidade de Iscas (Sachês 10 g)	6	6	2	2

Inspeccione com frequência, especialmente nos primeiros 5 - 10 dias, e enquanto o consumo persistir (se possível todas as semanas). Em cada inspeção, trocar qualquer isca que tenha sido consumida, contaminada ou estragada. Mantenha a oferta das iscas frescas até que não se evidenciem mais sinais da presença dos roedores.

Recomendações ao aplicador: Recomenda-se a colocação do produto dentro de porta-iscas que permitem o acesso exclusivo aos roedores, pois estes se sentem mais seguros comendo escondidos, além disso, o produto fica fora do alcance de crianças e animais não alvo.

Recomendações ao morador: Recomenda-se o aplicador orientar o morador a manter as crianças e os animais domésticos longe do produto.

Indicação para uso médico:

Antídoto/ Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: 0800 77 13 733

Telefone de Emergência Médica: 0800 70 10 450

TeleBayer: 0800 01 79 966

Observação

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.